



Continuità terapeutica dall'ospedale al domicilio.

La terapia a pressione negativa accompagna
il paziente dall'ospedale al domicilio.

Garantire continuità terapeutica oltre la dimissione.

La crescente pressione sui sistemi sanitari impone dimissioni sempre più tempestive, mantenendo al contempo elevati standard di assistenza. Nei pazienti con ferite complesse o di difficile guarigione, garantire continuità terapeutica dopo la dimissione rappresenta spesso una sfida.¹



Disponibilità limitata di personale e risorse per la gestione della NPWT



Applicazione complessa che richiede l'utilizzo di più componenti per la medicazione



Necessità di cambi di medicazione frequenti e impegnativi.



Preoccupazioni riguardo la continuità terapeutica lungo tutto il percorso di cura

Terapia a pressione negativa per la transizione alla vita quotidiana

Favorisci il recupero del paziente e la continuità terapeutica grazie alla combinazione della medicazione Solventum™ V.A.C.® Peel and Place e dell'Unità Terapeutica Prevena Plus™ 125. L'integrazione di queste soluzioni combina l'efficacia consolidata della Terapia V.A.C.® con semplicità di utilizzo, mobilità e supporto alla continuità assistenziale nel passaggio dall'ospedale al domicilio.



Unità terapeutica Prevena Plus™ 125

- Autonomia terapeutica fino a 14 giorni.
- Canister da 150 ml progettato per una semplice gestione dell'essudato.
- Utilizzo semplice e intuitivo con un solo pulsante



Medicazione Solventum™ V.A.C.® Peel and Place

- Fino a 7 giorni di durata²
- Non richiede tagli, pronta all'uso in meno di 2 minuti³
- Design integrato "all-in-one" pensato per favorire continuità e semplicità nel percorso di cura



Suggerimenti pratici

Questa case series pubblicata descrive un protocollo di dimissione standardizzato per i pazienti in NPWT monouso, che consente la prosecuzione del trattamento anche in ambito extra-ospedaliero. Il documento descrive le fasi operative per la selezione del paziente, l'applicazione della medicazione, l'educazione sanitaria e il follow-up, al fine di garantire una continuità assistenziale in totale sicurezza.

Una soluzione all-in-one, adatta a ogni contesto assistenziale



Fino a 7 giorni di durata², offre la possibilità ai pazienti che non possono usufruire delle visite domiciliari di beneficiare della Terapia V.A.C.[®].



Il 100% del personale infermieristico intervistato ha giudicato la medicazione V.AC.[®] Peel and Place **facile da usare³**



Il tempo medio di applicazione inferiore a 2 minuti rende il cambio della medicazione **più veloce del 61%.⁴**



Può contribuire a ridurre il numero di visite infermieristiche **fino al 67%.⁵**



10 pazienti su 10 **hanno riportato assenza di dolore alla rimozione.⁶**



Per ulteriori informazioni guarda il video introduttivo di Solventum™ V.A.C.[®] Peel and Place

Un percorso NPWT flessibile per la continuità assistenziale del paziente

Se il paziente è pronto a proseguire il percorso di guarigione fuori dall'ospedale e non è disponibile un'unità terapeutica ActiV.A.C.[™], esistono ora opzioni flessibili per garantire la continuità delle cure.

Sia che si utilizzi l'unità terapeutica Prevena Plus[™] 125 sia che si passi direttamente all'unità terapeutica ActiV.A.C.[™], le nostre soluzioni garantiscono una terapia costante e affidabile in tutti i contesti assistenziali.

In ospedale:



V.A.C.[®] Therapy

Unità terapeutica Prevena Plus 125



Alla dimissione:

è disponibile o indicata un'unità terapeutica ActiV.A.C. in ambito territoriale?

No

Sì




Unità terapeutica ActiV.A.C.

Se è necessario prolungare la NPWT, valutare il passaggio all'unità terapeutica ActiV.A.C.

Informazioni per gli ordini

Scegliere tra le unità terapeutiche e i kit per medicazioni elencati di seguito per garantire la continuità assistenziale dei pazienti tra le diverse strutture sanitarie.

Prodotto		Codice prodotto	Descrizione prodotto	Quantità
Kit di medicazione Peel and Place V.A.C.®		EZ5SML	Medicazione Small – 6,1 x 8,6 cm Profondità della ferita: 2 cm o meno	5
		EZ5MED	Medicazione Medium – 11,1 x 16,6 cm Profondità della ferita: 4 cm o meno	5
		EZ5LRG	Medicazione Large – 13,6 x 24,2 cm Profondità della ferita: 6 cm o meno	5
Unità terapeutica Prevena Plus 125 – 14 giorni		PRE4010	Unità terapeutica Prevena Plus 125 – 14 giorni, Canister Prevena Plus (150 ml), custodia da trasporto Prevena Plus e cavo di alimentazione	1
Canister Prevena Plus – 150 ml		PRE4095	Canister Prevena Plus (150 ml)	5

Riferimenti

- 1 Portou MJ, Collinsworth AW, Lookess S. Accelerating patient transitions from hospital to home in the United Kingdom with single-use negative pressure wound therapy: a discharge pathway. *Wounds*. 2025;37(8):305-313. doi:10.25270/wnds/24202.
- 2 SAT-BSER-05-869347 V.A.C. Peel and Place BSER.
- 3 In un test di utilizzo simulato condotto con 6 infermieri, la medicazione V.A.C.® Peel and Place ha ottenuto una valutazione media di 6,5 su 7 su una scala Likert a 7 punti. SAT-MTF-05-995965 Studio di marketing per la medicazione V.A.C. Peel and Place. 2023.
- 4 In un test di utilizzo simulato condotto su 12 professionisti tra infermieri e chirurghi. L'applicazione della medicazione V.A.C.® Peel & Place ha richiesto in media 1 minuto e 48 secondi, rispetto ai 4 minuti e 40 secondi della medicazione in schiuma tradizionale per NPWT con film ibrido acrilico-siliconico (p < 0,01, Wilcoxon signed rank test). SAT-MTF-05-995965 Studio di marketing per la medicazione V.A.C. Peel and Place. 2023.
- 5 In base alla durata fino a 7 giorni della medicazione V.A.C.® Peel and Place e alla raccomandazione di sostituzione ogni 2-3 giorni della medicazione V.A.C.® Granufoam. 510(k) K222859 [Medicazione V.A.C. Peel and Place]. SAT-TEST-RPT-05-893424 FDA System Test. 2022 [Medicazione V.A.C. Peel and Place]. SAT-TEST-RPT-05-794416 FDA System Functional Test Report [V.A.C./Dermatac/Granufoam system] 72 hr. performance test. 2022.
- 6 SAT-DOC-0000052106. 8005 Ganymede Customer Preference Test Post Market Customer Survey Report. 2021.



Solventum Italy Srl
Sede legale e amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
www.solventum.com/it-it/home

Nota: per questi prodotti e queste terapie esistono specifiche indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni sulla sicurezza. Prima dell'applicazione, consultare il personale medico e leggere attentamente le istruzioni per l'uso del prodotto. Dispositivi marcati CE - Informazioni tecnico-scienti che riservate al personale sanitario

© Solventum 2026. Tutti i diritti riservati. Solventum e il logo S sono marchi commerciali di Solventum o delle sue affiliate. 3M e il logo 3M sono marchi commerciali di 3M Company. OMG2392362.