



## Risicofactoren van patiënten en procedures

Naast dat chirurgische patiënten baat kunnen hebben bij Prevena Therapy, kan het voor patiënten met een hoog risico op complicaties, zoals een infectie op de plaats van de ingreep, extra toegevoegde waarde hebben. Hieronder wordt aan de hand van geselecteerde onderzoeksgegevens<sup>1-4</sup> een voorbeeldleidraad gegeven als hulpmiddel bij de risicofactoren. Dit betreft geen allesomvattende lijst van risicofactoren. Medisch specialisten wordt aangeraden hun klinisch inzicht te gebruiken om risicopatiënten en -procedures te identificeren.

Hier beginnen

### Risicofactoren van patiënten

Vasculaire chirurgie

▶ Vertoont de patiënt **ten minste één** van de volgende risicofactoren voor het ontwikkelen van chirurgische complicaties?

- ☐ BMI > 35 kg/m<sup>2</sup>
- ☐ Diabetes mellitus
- ☐ Hoge leeftijd
- ☐ Actief tabaksgebruik
- ☐ Hypertensie
- ☐ Ondervoeding

- ☐ Chronische nierziekte
- ☐ Chronische obstructieve longziekte
- ☐ Coronaire hartziekte
- ☐ Verhoogd cardiaal risico
- ☐ Significante pannus

Ja

Nee

### Risicofactoren van procedures

Vasculaire chirurgie

▶ Omvat de procedure een **hoog risico**?

- ☐ Spoedeisende chirurgie
- ☐ Revisiechirurgie
- ☐ Langdurige operatietijd
- ☐ Getraumatiseerde weke delen
- ☐ Incisie onder hoge spanning
- ☐ Meerdere incisies
- ☐ Amputatie boven de knie
- ☐ Amputatie onder de knie
- ☐ Synthetische graaftimplantaten
- ☐ Liesincisies

Ja

Nee

## Overweeg Prevena Therapy

Raadpleeg de handleiding van het 3M™ Prevena™-incisiemanagementsysteem voor behandelen of neem contact op met een vertegenwoordiger van 3M in uw regio voor aanvullende veiligheidsinformatie en gebruiksinstructies.



## Standaard wondverband

### Literatuur

1. Kwon J, et al. A randomized clinical trial evaluating negative pressure therapy to decrease vascular groin incision complications. *J Vasc Surg.* 2018 Dec;68(6):1744–1752.
2. Willy C, et al. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. *Int Wound J.* 2017 Apr;14(2):385–398.
3. Gombert A, Babilon M, Barbat M, et al. Closed-incision negative-pressure therapy reduces surgical site infections in vascular surgery: a prospective randomised multicentre trial (AIMS trial). *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2018; 56(3):442–448.
4. Plegier SP, Nink N, Elzien M, et al. Reduction of groin wound complications in vascular surgery patients using closed incision negative pressure therapy (ciNPT): a prospective, randomised, single-institution study. *Int Wound J* 2018;15(1):75–83.

## Verbetering van de zorgstandaard.

Distributed by:



**GD Medical**  
Hastelweg 224  
NL-5652 Eindhoven  
Tel +31 (0) 40 3031 099  
customerservice@gdmedical.nl  
www.gdmedical.nl

**GD Medical Belgium B.V**  
Priest Cuyperstraat 3  
B-1040 Brussel  
Tel +32 (0) 2 808 58 80  
customerservice@gdmedical.be  
www.gdmedical.be

[www.3M.nl/prevena](http://www.3M.nl/prevena)

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, beperkingen, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een behandelaar en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor medisch specialisten.

© 2024 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde handelsmerken. Onbevoegd gebruik is verboden. OMG967312



Scan de QR-code voor toegang tot klinisch bewijsmateriaal, casestudies, video's over producttoepassingen en meer.