solventum
Prevena™

GPR | Gestão Proativa de Riscos (GPR) com a Terapia Solventum™ Prevena™

Evidência clínica (nível I): Cirurgia ortopédica, ATJ e ATQ

Estratificação de risco do paciente e do procedimento com base em evidências clínicas

Embora os pacientes cirúrgicos possam se beneficiar da Terapia Prevena, os pacientes com alto risco de complicações, como infecção do sítio cirúrgico, podem obter benefícios adicionais. As informações a seguir utilizam dados selecionados de estudos[1-4] para fornecer um guia ilustrativo que auxilie na estratificação de risco. Esta não é uma lista completa de fatores de risco. Recomenda-se que os médicos utilizem seu julgamento clínico para identificar pacientes e procedimentos de risco.

Comece por aqui

Estratificação de risco do paciente
Artroplastia de quadril e joelho

O paciente apresenta **pelo menos um** dos seguintes fatores de risco para o desenvolvimento de complicações no sítio cirúrgico?

- ☐ Uso ativo de tabaco ou nicotina
- ☐ Doença autoimune
- ☐ Doença renal crônica
- ☐ Diabetes mellitus
- ☐ Anticoagulação sem aspirina
- ☐ Obesidade (p. ex., IMC > 30 kg/m²)
- ☐ Doença vascular periférica
- ☐ Colonização nasal por Staphylococcus aureus

Não →

Sim ↓

Estratificação de risco do procedimento
Artroplastia de quadril e joelho

O procedimento é de **alto risco**?

- ☐ Após o fechamento com retalhos
- ☐ Cirurgia de emergência
- ☐ Tempo cirúrgico prolongado
- ☐ Alto risco de comprometimento da perfusão
- ☐ Alto risco de edema
- ☐ Alto risco de linfedema
- ☐ Alto risco de formação de seroma
- ☐ Trauma de alta energia
- ☐ Incisão sob alta tensão
- ☐ Áreas extensas e desbridadas ao redor da incisão
- ☐ Múltiplas incisões
- ☐ Necessidade de reduzir o espaço do seroma
- ☐ Incisões não lineares, entrecruzadas ou ramificadas
- ☐ Sobre novas incisões que se estendem (ou sobrepõem) a incisões previamente cicatrizadas
- ☐ Incisões repetidas
- ☐ Cirurgia de revisão
- ☐ Preocupações com a cicatrização
- ☐ Sinais de hipoperfusão próximo à incisão
- ☐ Camada fina de tecidos moles
- ☐ Tecido mole traumatizado

Sim ↓ **Não** ↓

Considere a Terapia Prevena

Para obter informações adicionais de segurança e instruções de uso, consulte nosso site ou entre em contato com o representante local da Solventum.



Visite o site e selecione sua especialidade para saber mais

Curativo Padrão

Referências
1. Higuera-Rueda C, et al. The Effectiveness of Closed Incision Negative Pressure Therapy versus Silver-Impregnated Dressings in Mitigating Surgical Site Complications in High-Risk Patients after Revision Knee Arthroplasty: The PROMISES Randomized Controlled Trial. J Arthroplasty. 2021 Jul;36(7S):S295-S302.e14. **2.** Willy C, et al. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J. 2017 Apr;14(2):385-398. **3.** Newman JM, Siqueira MBP, Klika A, et al. Use of closed incisional negative pressure wound therapy after revision total hip and knee arthroplasty in patients at high risk for infection: A prospective, randomized clinical trial. Journal of Arthroplasty 2019; 34(3):554-559. **4.** Singh D, Alton T, Alvand A, et. al. Linear and Area Coverage with Closed Incision Negative Pressure Therapy Management: International Multidisciplinary Consensus Recommendations. International Wound Journal, 2025; 22:e7067. https://doi.org/10.1111/iwj.70677. **OPEN ACCESS**

Elevando o nível dos cuidados de saúde.

Fale com a Solventum
0800-7620042
falecom.br@solventum.com

solventum.com/pt-br/home/medical
solventummedicalbrasil
Solventum Medical

KCI é uma empresa do grupo Solventum.
3M Healthcare e KCI agora são Solventum.

A Unidade de Terapia Solventum™ Prevena™ 125 e a Unidade de Terapia Solventum™ Prevena Plus™ 125 controlam o ambiente das incisões cirúrgicas fechadas e removem o fluido da incisão cirúrgica por meio da aplicação de pressão negativa contínua de -125 mmHg. Quando utilizadas com curativos compatíveis comercializados legalmente, as Unidades de Terapia Prevena 125 e Prevena Plus 125 têm como objetivo auxiliar na redução da incidência de seroma; e, em pacientes com alto risco de infecções pós-operatórias, auxiliar na redução da incidência de infecção superficial do sítio cirúrgico em feridas de Classe I e Classe II.

A eficácia da Terapia Prevena na redução da incidência de ISC e seroma em todos os procedimentos cirúrgicos e populações não foi demonstrada. Consulte as indicações completas de uso e limitações em eifu.solventum.com.

Observação: Existem indicações específicas, limitações, contraindicações, advertências, precauções e informações de segurança relativas a esses produtos e terapias. Consulte um profissional de saúde e leia as instruções de uso do produto antes da aplicação. Somente com prescrição médica.

© Solventum 2026. Solventum, o logotipo S, Prevena e outras marcas registradas são marcas registradas da Solventum ou de suas afiliadas. Outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos titulares.